

Zgoda na zabieg operacyjny
Operacja spodziectwa

Informacja o zabiegu:

Spodziectwo - to wada rozwojowa polegająca na zaburzeniu zrastania i powstawania cewki moczowej oraz jej zewnętrznego ujścia. Wada ta dotyczy przede wszystkim noworodków płci męskiej, ale sporadycznie występuje również u dziewcząt. Prawidłowo ujście zewnętrzne cewki moczowej znajduje się na szczycie żołądździ, natomiast w przypadku spodziectwa ujście to umiejscowione jest na spodniej, czyli brzusznej stronie prącia. W niektórych przypadkach znajduje się ono nawet między fałdami moszny lub w okolicach krocza noworodka.

Wskazania: spodziectwo żołądździowe, prąciowe i mosznowe

Przeciwwskazania: Choroby towarzyszące uniemożliwiające znieczulenie pacjenta, wady towarzyszące uniemożliwiające wykonanie prawidłowej plastyki prącia

Oczekiwane korzyści: dobry efekt kosmetyczny

Metody alternatywne: nie występują

Ryzyko zabiegu: średnie

Możliwe powikłania:

1. Znaczna utrata krwi (krwawienie, krwotok, krwiak, krwimocz) oraz konieczność przetoczenia krwi
2. Zakażenie rany pooperacyjnej i ropień operowanej okolicy
3. Posocznica
4. Rozejście się rany pooperacyjnej
5. Skrócenie prącia
6. Zaburzenia seksualne
7. Zaburzenia mikcji
8. Wytworzenie się przetoki cewkowej
9. Skrzywienie prącia
10. Nawrót choroby
11. Konieczność wykonania kolejnych reoperacji
12. Zwężenie cewki moczowej(jako powikłanie cewnikowania)
13. Niewydolność nerkowa
14. Powikłania zakrzepowo-zatorowe
15. Odstąpienie od zabiegu
16. Infekcja dróg moczowych
17. Dolegliwości bólowe operowanej okolicy
18. Zgon

Okres pooperacyjny:

1. Po zabiegu chory przebywa w Klinice Urologii lub Oddziale Intensywnej Terapii
2. W trakcie pierwszych dni po zabiegu nie można przyjmować płynów ani posiłków
3. Usuwanie drenów oraz cewników następuje w pierwszych dniach po operacji

4. Chory jest informowany o wypisie w dniu lub dzień przed wypisem ze szpitala
5. Należy dokładnie przeczytać otrzymany wypis ze szpitala i postępować zgodnie z zaleceniami
6. Przez pierwszy miesiąc od operacji należy prowadzić oszczędny tryb życia
7. Ranę należy utrzymywać w suchości i czystości
8. W przypadku niepokojących objawów należy zgłosić się do Poradni Urologicznej w trybie pilnym ze skierowaniem od Lekarza POZ lub na Izbę Przyjęć szpitala.

Skutki odmowy i niepodjęcia proponowanego leczenia: defekt kosmetyczny

Zapoznałem się z treścią w/w dokumentu. Zrozumiałem i akceptuję powyższe informacje. Miałam/em możliwość zadawania pytań i udzielono mi na nie wyczerpującej odpowiedzi. Wyrażam zgodę na planowany zabieg operacyjny.

.....

Data i podpis czytelny pacjenta

.....

Data, pieczętka i podpis lekarza