

Zgoda na zabieg operacyjny
Operacja torbieli najądrza (spermatocele)

Informacja o zabiegu:

Torbiel najądrza to patologiczny zbiornik płynu w obrębie najądrza – struktury anatomicznej sąsiadującej bezpośrednio z jądrem. W wybranych sytuacjach może wymagać leczenia operacyjnego. Zabieg polega na wykonaniu niewielkiego nacięcia na skórze moszny po chorej stronie. Po dotarciu do torbieli ulega ona wypreparowaniu i usunięciu. Na skórze moszny pozostaje niewielka blizna.

Oczekiwane korzyści: efekt kosmetyczny

Alternatywne sposoby leczenia: nakłucie spermatocele

Możliwe powikłania:

1. Zakażenie rany pooperacyjnej i ropień operowanej okolicy
2. Konieczność usunięcia jądra
3. Posocznica
4. Rozejście się rany pooperacyjnej
5. Niepłodność
6. Nawrót choroby
7. Powikłania zakrzepowo-zatorowe
8. Odstąpienie od zabiegu
9. Zwężenie cewki moczowej
10. Zgon

Okres pooperacyjny:

1. Po zabiegu chory przebywa w Klinice Urologii
2. W trakcie pierwszych godzin po zabiegu nie można przyjmować płynów ani posiłków
3. Usuwanie drenów oraz cewników następuje w pierwszych dniach po operacji
4. Chory jest informowany o wypisie w dniu lub dzień przed wypisem ze szpitala
5. Należy dokładnie przeczytać otrzymany wypis ze szpitala i postępować zgodnie z zaleceniami
6. Przez pierwsze dwa tygodnie od operacji należy prowadzić oszczędny tryb życia
7. Ranę należy utrzymywać w suchości i czystości
8. W przypadku niepokojących objawów należy zgłosić się do Poradni Urologicznej w trybie pilnym ze skierowaniem od Lekarza POZ lub na Izbę Przyjęć szpitala.

Skutki odmowy i niepodjęcie proponowanego leczenia: defekt kosmetyczny

Zapoznałem się z treścią w/w dokumentu. Zrozumiałem i akceptuję powyższe informacje. Miałem możliwość zadawania pytań i udzielono mi na nie wyczerpującej odpowiedzi. Wyrażam zgodę na planowany zabieg operacyjny.

.....
Data i podpis czytelny pacjenta

.....
Data, pieczętka i podpis lekarza